


توده هیپوفیز



واحد آموزش

غده هیپوفیز غده کوچکی به اندازه نخود در زیر مغز و درون حفره استخوان شب پره است که تنظیم اکثر هورمونهای بدن را بر عهده دارد. اکثر تومورهای هیپوفیز خوش خیم هستند و پتانسیل ایجاد تومور بد خیم در آن ناچیز است.



علائم

- ❖ تاری دید و دو بینی
- ❖ سردرد در ناحیه پیشانی
- ❖ تهوع و استفراغ
- ❖ آبریزش بینی
- ❖ اختلالات هورمونی و تغییرات در قاعدگی
- ❖ افتادگی پلک ناشی از فشار تومور بر روی اعصاب چشم

تشخیص

- ❖ بررسی هورمونی
- ❖ MRI
- ❖ CT SCAN
- ❖ تعیین میدان بینایی

علائم

❖ عمل جراحی برداشتن تومور
اغلب این تومور با جراحی برداشته می شود به این معنی که جراح تومور هیپوفیز را از طریق بینی و به روش آندوسکوپی با میکروسکوپی خارج می کند در این روش فضای خالی تومور با چربی زیر پوست شکم پر می شود.

- ❖ درمان دارویی
- ❖ پرتو درمانی (جهت فرسایش تومور)


عوارض احتمالی

- ❖ خونریزی
 - ❖ عفونت که بسیار کم دیده می شود.
 - ❖ سر درد های ناشی از التهاب سینوسی ۱-۲ هفته ای بعد از عمل
 - ❖ آبریزش از بینی
 - ❖ خون دماغ
 - ❖ افزایش ادرار
 - ❖ تهوع و استفراغ
 - ❖ نوسان خلق
 - ❖ ناتوانی جنسی
 - ❖ اختلالات هورمونی
- ◀ در صورتیکه عمل هیپوفیز با کاهش سریع هورمونهای هیپوفیز همراه باشد می توان با دارو های جایگزین برطرف شود.

مراقبت های بعد از عمل

- ❖ از خم کردن سر جداً خودداری شود.
- ❖ از زور زدن و کار سنگین خودداری شود.
- ❖ ممکن است حس تهوع و استفراغ را در روز اول بعد از جراحی تجربه کنید که مربوط به خونی است که می تواند حین جراحی وارد گلو شود می توانید از ضد تهوع ها طبق دستور پزشک استفاده کنید.
- ❖ ممکن است احساس تنگی نفس و گرفتگی بینی داشته باشید. از قطره نرمال سالین برای مرطوب کردن بینی استفاده شود.
- ❖ در صورت عدم مشکل در مصرف مایعات چند ساعت بعد از جراحی می توانند مصرف غذا های نرم را شروع کنند.
- ❖ در زمان تشنگی مایعات فراوان مصرف کنید.

- ❖ بهتر است خروجی ادرار خود را تا چند روز بعد جراحی در منزل اندازه گیری کنید و در صورت غیر طبیعی بودن به پزشک خود اطلاع رسانی کنید.
- ❖ اگر علائم و نشانه های مربوط به آبریزش از بینی داشتید (خروج مایعات مغز و نخاع از بینی) با پزشک معالج خود مشورت کنید.
- ❖ بینی خود را تخلیه نکنید.
- ❖ محلول نمکی می تواند به بهبود زخم و مرطوب ماندن و جلوگیری از ترک و خونریزی کمک کند.
- ❖ می توانید پس از عمل جراحی، مصرف دوباره داروهای بیماری های زمینه ای قبلی خود را بعد از مشورت با پزشک از سر بگیرند.
- ❖ سردرد تا چند روز پس از عمل جراحی ممکن است وجود داشته باشد جهت مصرف مسکن ها با پزشک خود مشورت کنید.
- ❖ داروهای تجویزی طبق نظر پزشک مصرف شود. جهت پیگیری بعد از دو هفته با جواب پاتولوژی به پزشک مراجعه شود.



آدرس : تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک ۲۳، واحد ۵

تلفن تماس : ۰۹۱۹۱۲۳۹۴۶۰ - ۰۲۱۸۸۵۲۹۸۰۴

ایمیل: info@irneso.com

انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران از سال ۱۳۵۷ فعالیت خود را آغاز نموده و انجمنی علمی و تخصصی است که با هدف ارتقای دانش، آموزش، پژوهش و توسعه همکاری های علمی در حوزه جراحی مغز و اعصاب فعالیت می کند. این انجمن با گردهم آوردن جراحان مغز و اعصاب، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، پژوهشگران و دستیاران تخصصی از سراسر کشور، بستری برای تبادل دانش، تجربیات و دستاوردهای علمی فراهم کرده است.

همچنین با برگزاری کنگره های سالانه، سمپوزیوم ها، کارگاه های آموزشی، وبینارها و برنامه های بازآموزی، نقش موثری در ارتقای سطح علمی و مهارت های تخصصی جامعه نوروسرجری ایران ایفا می کند. همچنین با حمایت از فعالیت های پژوهشی، توسعه استانداردهای علمی و درمانی و ترویج نوآوری در حوزه جراحی مغز و اعصاب، در راستای بهبود کیفیت خدمات درمانی و سلامت بیماران گام بر می دارد.

انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران همواره بر گسترش تعاملات علمی با انجمن ها و سازمان های معتبر بین المللی تاکید داشته و با توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی، در تلاش است تا جایگاه علمی نوروسرجری ایران را در سطح منطقه و جهان بیش از پیش ارتقاء دهد.